

Orgovyx

Generic Name: relugolix

Brand Name: *Orgovyx*

Medically reviewed by Drugs.com. Last updated on Feb 10, 2021.

[Direcciones](#) [Dosis](#) [Sobredosis](#) [Efectos secundarios](#) [Interacciones](#)

¿Qué es relugolix?

Relugolix se usa para tratar el cáncer de próstata avanzado.

Relugolix puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre relugolix?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta y el paquete de la medicina. Dígale a cada uno de sus proveedores de salud acerca de todas sus condiciones médicas, alergias y todas las medicinas que usted esté usando.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar relugolix?

Relugolix no se usa en mujeres o niños.

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

- problemas cardíacos; o
- el síndrome de QT largo (en usted o un miembro de su familia).

Use un método efectivo de control de la natalidad si su pareja sexual esta embarazada o puede quedar embarazada. Relugolix puede causarle daño al bebé nonato si el padre esta usando esta medicina. Siga usando control de la natalidad durante al menos 2 semanas después de la última dosis de esta medicina.

Esta medicina puede afectar la fertilidad (habilidad de tener hijos). Sin embargo, es importante usar control de la natalidad si su pareja está embarazada o puede quedar embarazada porque relugolix puede causar daño al bebé nonato.

¿Cómo debo tomar relugolix?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento o las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado.

Relugolix se toma generalmente como 3 tabletas el primer día, seguido por 1 tableta por día a partir de entonces.

Tome la medicina a la misma hora cada día, con o sin comida.

Trague la tableta entera y no la triture, la mastique, o la rompa.

Es posible que necesite pruebas de sangre frecuentes. Es posible que sea necesario chequear la función cardíaca con un electrocardiógrafo o electrocardiograma o ECG (algunas veces llamado EKG, por sus siglas en inglés).

Su médico determinará por cuánto tiempo debe darle tratamiento con relugolix. No cambie la dosis ni deje de usar esta medicina sin el consejo de su médico.

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad y del calor. Mantenga las tabletas en su contenedor original, junto con el paquete o envase conservador que absorbe la humedad.

Mantenga la botella bien cerrada cuando no la esté usando.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Use la medicina tan pronto pueda, pero sáltese la dosis que dejó de usar si tiene más de 12 horas de retraso para la dosis. No use dos dosis a la vez.

Si deja de usar más de 7 dosis diarias, su médico puede querer que reinicie la medicina tomando 3 tabletas el primer día y 1 tableta diaria a partir de entonces.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

¿Qué debo evitar mientras tomo relugolix?

Siga las instrucciones de su médico acerca de cualquier restricción de comidas, bebidas, o actividades.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de relugolix?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **signos de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- latidos cardíacos rápidos o fuertes, aleteo cardíaco en su pecho, falta de aire al respirar, y mareo repentino (como que se puede desmayar);
- dolor o presión en el pecho;
- entumecimiento repentino o debilidad de un lado de su cuerpo;
- poco o nada de orina, dolor o quemazón al orinar;
- dolor o hinchazón en las mamas;
- estado de ánimo deprimido; o
- sangrado inusual.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- sofocos (sensación súbita de calor, enrojecimiento, u hormigueo);
- sentirse cansado;
- aumento de peso;
- impotencia, problemas sexuales;
- diarrea, estreñimiento;
- dolor muscular o de las articulaciones; o
- pruebas de laboratorio anormales.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a relugolix?

A veces no es seguro usar ciertos medicamentos al mismo tiempo. Algunas drogas pueden afectar los niveles sanguíneos de otros medicamentos que usted tome, lo que puede aumentar los efectos secundarios o hacer que los medicamentos sean menos eficaces.

Ciertas otras drogas no deben usarse dentro de las 6 horas después que usted tome relugolix. Su dosis de relugolix debe tomarse primero, antes de la otra medicina. Siga con cuidado las instrucciones de su médico sobre cómo programar las dosis de todas sus medicinas.

Otras drogas pueden afectar a relugolix, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina que comience o deje de usar.

¿Dónde puedo obtener más información?

- Su farmacéutico le puede dar más información acerca de relugolix.
- Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.
- Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente.

Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Further information

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.

Copyright 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Version: 1.01.