

Lynparza

Generic Name: olaparib

Brand Name: *Lynparza*

¿Qué es olaparib?

Olaparib se usa para tratar cánceres de mama, ovario, trompa de Falopio, páncreas, próstata, o peritoneo (la membrana que recubre el interior del abdomen y cubre algunos de los órganos internos).

Olaparib a veces se usa cuando el cáncer se ha propagado hasta otras partes del cuerpo, o cuando el cáncer ha regresado después del tratamiento con otros medicamentos.

Olaparib a veces se usa solo si el cáncer tiene un marcador genético específico (un gen anormal "BRCA" o "HRR"). Su médico examinará si usted tiene éste gen.

Olaparib puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre olaparib?

Olaparib afecta su sistema inmunológico. **Es posible que usted tenga infecciones con más facilidad, incluso infecciones serias o fatales.** Llame a su médico si tiene fiebre, debilidad, cansancio, dificultad para respirar, moretones o sangrados fáciles, sangre en la orina o heces, o pérdida de peso.

Usted va a necesitar exámenes de sangre semanales o mensuales, y sus tratamientos de cáncer tal vez puedan ser retrasados basados en los resultados.

Algunas personas que toman olaparib con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, por sus siglas en inglés) pueden desarrollar un coagulo de sangre en la pierna o en el pulmón. Llame a su médico si usted tiene dolor o hinchazón en el brazo o la pierna, falta de aire al respirar, dolor en el pecho, respiración rápida, o latidos cardíacos rápidos.

Olaparib también puede causar problemas serios de los pulmones. Llame a su médico si usted tiene dolor de pecho, sibilancias, dificultad para respirar, o tos nueva o que empeora.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar olaparib?

Usted no debe usar olaparib si es alérgico a éste.

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

- enfermedad de los pulmones, problemas de la respiración; o
- enfermedad del riñón.

Olaparib puede causar daño al bebé nonato o causar un aborto espontáneo **si la madre o el padre está usando esta medicina.**

- **Si usted es una mujer**, no use esta medicina si está embarazada. Usted puede necesitar tener una prueba de embarazo negativa antes de comenzar este tratamiento. Use un método efectivo para prevenir el embarazo mientras está usando esta medicina, y por al menos 6 meses después de su última dosis.
- **Si usted es un hombre**, use un método efectivo de control de la natalidad si su pareja sexual puede quedar embarazada. Siga usando control de la natalidad por al menos 3 meses después de su última dosis. Tampoco done espermatozoides durante los 3 meses después de su última dosis.
- Dígale a su médico de inmediato si ocurre un embarazo mientras la madre o el padre está usando olaparib.

No amamante mientras está usando esta medicina, y por al menos 1 mes después de su última dosis.

¿Cómo debo tomar olaparib?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento o las hojas de instrucción. Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis. Use la medicina exactamente como indicado.

Tome sus dosis a intervalos regulares, aproximadamente cada 12 horas. Usted puede tomar olaparib con o sin comida.

Trague la tableta entera y no la triture, la mastique, o la rompa.

Olaparib afecta su sistema inmunológico. Es posible que usted tenga infecciones con más facilidad, incluso infecciones serias o fatales. Su médico necesitará examinarlo con regularidad.

Usted también puede necesitar una radiografía de pecho para estar seguro de que esta medicina no le está haciendo daño a sus pulmones. Sus tratamientos de cáncer tal vez puedan ser retrasados basados en los resultados.

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad y del calor.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Sáltese la dosis perdida y use su próxima dosis en su horario regular. No use dos dosis a la vez.

No tome más de 4 tabletas de olaparib en un día.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

¿Qué debo evitar mientras tomo olaparib?

La toronja y las naranjas de Sevilla pueden interactuar con olaparib y resultar en efectos secundarios no deseados. Evite el uso de productos de toronja y mermeladas de naranja.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de olaparib?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **signos de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Usted puede contraer infecciones con más facilidad, incluso infecciones serias o fatales.

Llame de inmediato a su médico si tiene signos de infección, como:

- fiebre, escalofríos, debilidad, sentir que se va a desmayar o muy cansado;
- llagas en la boca, llagas en la piel;
- moretones fáciles, sangrado inusual;
- dolor o quemazón al orinar, sangre en su orina o heces;
- piel pálida, manos y pies fríos;
- pérdida de peso; o
- tos, sibilancias, falta de aire al respirar.

Sus tratamientos de cáncer tal vez puedan ser retrasados si usted tiene ciertos efectos secundarios.

Algunas personas que toman olaparib con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, por sus siglas en inglés) pueden desarrollar un coagulo de sangre en la pierna o en el pulmón. Llame a su médico si usted tiene dolor o hinchazón en el brazo o la pierna, falta de aire al respirar, dolor en el pecho, respiración rápida, o latidos cardíacos rápidos.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- conteo bajo de las células sanguínea;
- dolor y quemazón al orinar, dolor al orinar;

- náusea, vómito, dolor en la parte superior del estómago, diarrea;
- acidez, indigestión, pérdida del apetito;
- mareo, sensación de debilidad o cansancio;
- dolor de cabeza;
- tos, falta de aire al respirar; o
- el sentido del sabor alterado.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a olaparib?

A veces no es seguro usar ciertos medicamentos al mismo tiempo. Algunas drogas pueden afectar los niveles sanguíneos de otros medicamentos que usted tome, lo que puede aumentar los efectos secundarios o hacer que los medicamentos sean menos eficaces.

Otras drogas pueden afectar a olaparib, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina que comience o deje de usar.

¿Dónde puedo obtener más información?

- Su médico o farmacéutico le puede dar más información acerca de olaparib.
- Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.
- Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma,

interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2018 Cerner Multum, Inc. Version: 6.01.

Further information

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.