

Nubeqa

Generic Name: darolutamide

Brand Name: *Nubeqa*

¿Qué es darolutamide?

Darolutamide se usa para tratar el cáncer de próstata que no se ha extendido a otras partes de su cuerpo.

Darolutamide se da después que la cirugía u otros tratamientos no funcionaron o hayan dejado de funcionar.

Darolutamide puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre darolutamide?

Siga las instrucciones en la etiqueta y el paquete de la medicina. Dígale a cada uno de sus proveedores de salud acerca de todas sus condiciones médicas, alergias y todas las medicinas que usted esté usando.

¿Qué debería discutir con el profesional del cuidado de la salud antes de tomar darolutamide?

Dígale a su médico si alguna vez ha tenido:

- enfermedad del hígado o riñón.

Aunque darolutamide no se usa en las mujeres, esta medicina puede causar daño al bebé nonato o causar un aborto espontáneo si una mujer está expuesta durante el embarazo.

Use un método efectivo de control de la natalidad si su pareja sexual puede quedar embarazada. Siga usando control de la natalidad por al menos 1 semana después de su última dosis. Dígale a su médico de inmediato si ocurre un embarazo mientras está usando darolutamide.

Esta medicina puede afectar la fertilidad (su habilidad de tener hijos). Sin embargo, es importante usar control de la natalidad para prevenir un embarazo porque darolutamide puede causar daño al bebé nonato.

¿Cómo debo tomar darolutamide?

Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su prescripción y lea todas las guías del medicamento y las hojas de instrucción. Use la medicina exactamente como indicado.

Tome con comida.

Trague la tableta entera y no la triture, la mastique, o la rompa.

Si usted no ha tenido cirugía para disminuir la cantidad de testosterona en su cuerpo, su médico también puede recetarle un medicamento de hormona liberadora de gonadotropina (GnRH por sus siglas en inglés) como Eligard, Lupron, Trelstar, Zoladex, o Vantas. Siga usando su GnRH según lo indicado.

Guarde a temperatura ambiente fuera de la humedad y del calor. Mantenga la botella bien cerrada cuando no la esté usando.

¿Qué sucede si me salto una dosis?

Tome la medicina tan pronto pueda, pero sátese la dosis que dejó de tomar si ya casi es hora para la próxima dosis. No tome dos dosis a la vez.

¿Qué sucedería en una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia o llame a la línea de Poison Help al 1-800-222-1222.

¿Qué debo evitar mientras tomo darolutamide?

Siga las instrucciones de su médico acerca de cualquier restricción de comidas, bebidas, o actividades.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de darolutamide?

Busque atención médica de emergencia si usted tiene **signos de una reacción alérgica**: ronchas; dificultad para respirar; hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.

Llame a su médico de inmediato si usted tiene:

- síntomas severos y continuos de náusea o diarrea;
- dolor o dificultad al orinar;
- sangre en la orina;
- dolor de cabeza severo, visión borrosa, palpitaciones en su cuello o en sus oídos;
- latido cardíaco lento, pulso débil, desmayo, respiración lenta (la respiración puede parar);
- signos de un coágulo sanguíneo en el pulmón--dolor de pecho, tos repentina, sibilancias, respiración rápida, tos con sangre; o

- signos de infección pulmonar--fiebre, escalofríos, tos con moco, dolor de pecho, sensación de que le falta aire al respirar.

Sus tratamientos de cáncer tal vez puedan ser retrasados si usted tiene ciertos efectos secundarios.

Efectos secundarios comunes pueden incluir:

- sentirse cansado;
- dolor en los brazos, las manos, las piernas, o los pies;
- sarpullido;
- conteo bajo de glóbulos blancos; o
- pruebas anormales de la función del hígado.

Esta lista no menciona todos los efectos secundarios y puede ser que ocurran otros. Llame a su médico para consejos médicos relacionados a efectos secundarios. Usted puede reportar efectos secundarios llamando al FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Qué otras drogas afectarán a darolutamide?

A veces no es seguro usar ciertos medicamentos al mismo tiempo. Algunas drogas pueden afectar los niveles sanguíneos de otros medicamentos que usted tome, lo que puede aumentar los efectos secundarios o hacer que los medicamentos sean menos eficaces.

Otras drogas pueden afectar a darolutamide, incluyendo medicinas que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. Dígale a su médico todas las medicinas que usa, y cualquier medicina que comience o deje de usar.

¿Dónde puedo obtener más información?

- Su farmacéutico le puede dar más información acerca de darolutamide.
- Recuerde, mantenga ésta y todas las otras medicinas fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicinas con otros, y use este medicamento solo para la condición por la que fue recetada.
- Se ha hecho todo lo posible para que la información que proviene de Cerner Multum, Inc. ('Multum') sea precisa, actual, y completa, pero no se hace garantía de tal. La información sobre el medicamento incluida aquí puede tener nuevas recomendaciones. La información preparada por Multum se ha creado para uso del profesional de la salud y para el consumidor en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y por lo cual Multum no certifica que el uso fuera de los EE.UU. sea apropiado, a menos que se mencione específicamente lo cual. La información

de Multum sobre drogas no sanciona drogas, ni diagnóstica al paciente o recomienda terapia. La información de Multum sobre drogas sirve como una fuente de información diseñada para la ayuda del profesional de la salud licenciado en el cuidado de sus pacientes y/o para servir al consumidor que reciba este servicio como un suplemento a, y no como sustituto de la competencia, experiencia, conocimiento y opinión del profesional de la salud. La ausencia en éste de una advertencia para una droga o combinación de drogas no debe, de ninguna forma, interpretarse como que la droga o la combinación de drogas sean seguras, efectivas, o apropiadas para cualquier paciente. Multum no se responsabiliza por ningún aspecto del cuidado médico que reciba con la ayuda de la información que proviene de Multum. La información incluida aquí no se ha creado con la intención de cubrir todos los usos posibles, instrucciones, precauciones, advertencias, interacciones con otras drogas, reacciones alérgicas, o efectos secundarios. Si usted tiene alguna pregunta acerca de las drogas que está tomando, consulte con su médico, enfermera, o farmacéutico.

Copyright 1996-2018 Cerner Multum, Inc. Version: 1.01.

Further information

Always consult your healthcare provider to ensure the information displayed on this page applies to your personal circumstances.